



Cyanea lamarckii (Blå brennmanet)




Foto: Erling Svensen



Foto: Erling Svensen



Foto: Erling Svensen

Beskrivelse

Hører til skivemanetene (Orden Semaestomeae). Blå brennmanet kan variere i farge. Store individer kan være lilla-blå eller i noen tilfeller gulaktige. Små individer kan være blekere, nesten fargeløse. Blå brennmanet er mindre og mer gjennomsiktig enn rød brennmanet (*C. capillata*).

Størrelse

10-15 cm

Levesett

Blå brennmanet er et rovdyr. Den driver med strømmen men har svømmebevegelser som gjør at de kan å regulere dypet de befinner seg på. Foretrekker kysthabitater for å fange store mengder plankton.

Giftighet

Blå brennmanet tilhører nesledyrene. Nesledyrene har neslegift som de bruker til å lamme og drepe byttedyr eller forsvare seg mot fiender. Blå brennmanet har samme type gift som den røde brennmaneten (*C. capillata*) men den er mindre og har færre brenntråder. Antar at neslegiften kan skade fiskens gjeller, hud og øyne.



Data hentet fra artsdatabanken og viser registreringer av arten.

Utbredelse i Norge

Blå brennmanet forekommer langs hele kysten og i fjordene, men er mest vanlig langs kysten av Sør-Norge. De senere årene har man observert en gradvis mer nordlig utbredelse.